

薬剤名	ディフェリンゲル (アダパレン)	ペピオゲル・ローション (過酸化ベンゾイル)		デュアック配合ゲル (克林ダマイシン/過酸化ベンゾイル)	エピデュオゲル (過酸化ベンゾイル/アダパレン)
					
特徴	- 毛穴のつまりを改善させ白ニキビをできずらくする - 目に見えない面皰(マイクロコメド)の発生を抑える効果がある。 12週間で非炎症性皮疹を6割減少	- 角質剥離(ピーリング)効果がある - アクネ菌などに対する抗菌効果がある 12週間で皮疹数が6割減少(赤ニキビを7割減少)		- ペピオと抗生物質である克林ダマイシンの合剤でとくに赤ニキビに有効 - 赤ニキビを12週間で8割減少	- ペピオとディフェリンの合剤 12週間で皮疹数が8割減少 - ニキビ痕予防の効果あり
対象となる にきび	白ニキビに有効	白ニキビ・赤ニキビともに有効		特に赤ニキビに有効 (白ニキビにも効果あり)	赤ニキビ、白ニキビともに有効
	急性期・維持期ともに使用可能	急性期・維持期ともに使用可能		急性期に特に有効	急性期・維持期ともに使用可能
使用方法	1日1回				
使用部位	顔のみ	顔・からだともに使用可能		顔・からだともに使用可能	顔のみ
妊娠中の 使用	不可	可		可	不可
使用可能 年齢	原則12歳以上				
副作用	顔のみ	かぶれが出る可能性あり			
	全体 84.0% 乾燥 60.4% 不快感 54.7% 皮膚剥脱 36.9% 赤み 25.0% かゆみ 15.1%	ゲル 全体 11.9% 乾燥 2.8% 刺激感 0.9% 皮膚剥脱 0.9% 赤み 4.6% かゆみ 2.8% かぶれ 1.8%	ローション 全体 37.3% 刺激感 8.3% 皮膚剥脱 19.1% 赤み 13.7% かゆみ 3.4% かぶれ 12.5%	全体 24.0% 乾燥 7.4% 皮膚剥脱 2.0% 赤み 3.9% かゆみ 4.4% かぶれ 5.4%	全体 12.7% 刺激感 10.7% 赤み 0.9%